

Mat02219 - Probabilidade

Prof. Lorí Viali, Dr.

viali@mat.ufrgs.br

<http://www.mat.ufrgs.br/~viali/>

4/4

A Distribuição Normal



Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística





Uma variável aleatória X tem uma distribuição **normal** se sua fdp for do tipo:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\mathbf{x}-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad \mathbf{x} \in \mathfrak{R}$$

com $-\infty < \mu < \infty$ e $\sigma > 0$



Representação Gráfica



Cálculo de Probabilidades

$$P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{u-\mu}{\sigma}\right)^2} du = ?$$

A normal não é integrável através do TFC, isto é, não existe $F(x)$ tal que $F'(x) = f(x)$.



Solução

Utilizar integração numérica.
Como não é possível fazer isto com todas as curvas, escolheu-se uma para ser tabelada (integrada numericamente).



A Normal Padrão

A curva escolhida é a $N(0, 1)$, isto é, com $\mu = 0$ e $\sigma = 1$.

Se X é uma $N(\mu, \sigma)$, então:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Será uma $N(0; 1)$




A fdp da variável Z é dada por:

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{z^2}{2}}, \quad z \in \mathfrak{R}$$

uma vez que $\mu = 0$ e $\sigma = 1$.



A Distribuição $N(0; 1)$




Tabela

O que é tabelado é a FDA da variável Z , isto é:

$$\begin{aligned} P(Z \leq z) &= \int_{-\infty}^z \varphi(u) du = \\ &= \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} du = \Phi(z) \end{aligned}$$



A FDA da $N(0; 1)$



Uso da Tabela

Área à esquerda (abaixo) de “z”

$$P(Z \leq z) = \Phi(z) = \text{Leitura direta}$$

Área à direita (acima) de “z”

$$P(Z > z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - \Phi(z) = \Phi(-z)$$

Área entre dois valores de “z”

$$P(z_1 < Z < z_2) = \Phi(z_2) - \Phi(z_1)$$



A tabela é construída como uma matriz. As linhas fornecem a unidade ou unidade mais décimo e as colunas fornecem os centésimos.

Assim para ler, por exemplo, $-0,15$ deve-se procurar na linha do $-0,1$ + coluna do 5 (sexta coluna). A primeira é a do “0” (zero).




A aproximação é centesimal (2 casas após a vírgula) exceto na linha do -3 e do $+3$, que estão destacadas, onde a aproximação é, em virtude da pouca área, **decimal**. Observe que está escrito -3 e não $-3,0$!



Tabela da Distribuição Normal

Aproximação decimal, isto é, fatias de 0,1. Depois do $\pm 3,0$ segue $\pm 3,1$ o $\pm 3,2$ até $\pm 3,9$.

Aproximação centesimal, isto é, fatias de 0,01. Depois do $-3,0$ segue $-2,99$ o $-2,98$ até $+2,99$ e daí $3,0$.




| Z | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| -3 | 0,0013 | 0,0019 | 0,0007 | 0,0005 |
| -2,9 | 0,0017 | 0,0024 | 0,0018 | 0,0017 |
| -2,8 | 0,0026 | 0,0032 | 0,0024 | 0,0023 |
| -2,7 | 0,0035 | 0,0044 | 0,0033 | 0,0032 |
| -2,6 | 0,0047 | 0,0057 | 0,0044 | 0,0043 |
| -2,5 | 0,0060 | 0,0071 | 0,0057 | 0,0057 |
| -2,4 | 0,0082 | 0,0095 | 0,0078 | 0,0075 |
| -2,3 | 0,0107 | 0,0125 | 0,0104 | 0,0099 |
| -2,2 | 0,0139 | 0,0160 | 0,0130 | 0,0125 |
| -2,1 | 0,0179 | 0,0205 | 0,0164 | 0,0160 |
| -2,0 | 0,0228 | 0,0255 | 0,0217 | 0,0212 |

$P(Z < -3,3)$
 $= \Phi(-3,3)$

$P(Z < -2,53)$
 $= \Phi(-2,53)$

$P(Z < -2,00)$
 $= \Phi(-2,00)$



Exemplo

Uma VAC tem distribuição normal de média 50 e desvio padrão 8.

Determinar:

(a) $P(X \leq 40)$

(b) $P(X > 65)$

(c) $P(45 < X < 62)$



(a) $P(X \leq 40)$

$$\begin{aligned} P(X \leq 40) &= P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{40 - 50}{8}\right) = \\ &= P(Z \leq -1,25) = 10,56\% \end{aligned}$$



(b) $P(X > 65)$

$$\begin{aligned} P(X > 65) &= P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} > \frac{65 - 50}{8}\right) = \\ &= P(Z > 1,88) = 1 - P(Z < 1,88) = \\ &= 1 - \Phi(1,88) = \Phi(-1,88) = 3,01\% \end{aligned}$$



$$(c) P(45 < X < 62)$$

$$P(45 < X < 62) =$$

$$= P\left(\frac{45 - 50}{8} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{62 - 50}{8}\right) =$$

$$= P(-0,62 < Z < 1,50) =$$

$$= \Phi(1,50) - \Phi(-0,62) =$$

$$= 93,32\% - 27,67\% = 65,65\%$$



A Função Inversa



Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística



Uma VAC tem distribuição normal de média 50 e desvio padrão 8. Determinar:

(a) $P(X \leq x) = 5\%$


(b) $P(X > x) = 1\%$



Para resolver este tipo de exercício é preciso utilizar a função inversa, isto pode ser feito direto na tabela. Só que agora devemos procurar uma probabilidade (corpo da tabela) e obter um valor de “z” (lateral da tabela).



Graficamente:



Em **(a)** temos $P(X \leq x) = 5\%$

$$P(X \leq x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - 50}{8}\right) =$$

$$= P(Z \leq z) = \Phi(z) = 5\%$$

$$\text{onde } z = \frac{x - 50}{8}$$



Se $\Phi(z) = 5\%$, então

$$\Phi^{-1}[\Phi(z)] = \Phi^{-1}(5\%)$$

$$z = \Phi^{-1}(0,05)$$

Procurando na tabela, o valor (z)
mais próximo de $5\% = 0,05$, tem-se:



| z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| -3 | 0,0013 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0002 |
| -2,9 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 |
| -2,8 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0022 |
| -2,7 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0030 |
| -2,6 | 0,0047 | 0,0045 | 0,0044 | 0,0043 | 0,0041 | 0,0040 |
| -2,5 | 0,0062 | 0,0060 | 0,0059 | 0,0057 | 0,0055 | 0,0054 |
| -2,4 | 0,0082 | 0,0080 | | | | |
| -2,3 | 0,0107 | 0,0104 | | | | |
| -2,2 | 0,0139 | 0,0136 | 0,0132 | 0,0129 | 0,0125 | 0,0122 |
| -2,1 | 0,0179 | 0,0174 | 0,0170 | 0,0166 | 0,0162 | 0,0158 |
| -2,0 | 0,0228 | 0,0222 | 0,0217 | 0,0212 | 0,0207 | 0,0202 |
| -1,9 | 0,0287 | 0,0281 | 0,0274 | 0,0268 | 0,0262 | 0,0256 |
| -1,8 | 0,0359 | 0,0351 | 0,0344 | 0,0336 | 0,0329 | 0,0322 |
| -1,7 | 0,0446 | 0,0436 | 0,0427 | 0,0418 | 0,0409 | 0,0401 |
| -1,6 | 0,0548 | 0,0537 | 0,0526 | 0,0516 | 0,0505 | 0,0495 |
| -1,5 | 0,0668 | 0,0655 | 0,0643 | 0,0630 | 0,0618 | 0,0606 |

z = -1,64

z = -1,65



Como os dois valores estão a mesma distância, isto é, apresentam o mesmo erro (0,0005), pega-se a média entre eles.



Assim

$$z = \frac{1,64 + 1,65}{2} = 1,645$$

Como $z = \frac{x - 50}{8}$, tem-se :

$$-1,645 = z = \frac{x - 50}{8} \Rightarrow$$

$$x = 50 - 1,645 \cdot 8 = 36,84$$




Em **(b)** temos $P(X > x) = 1\%$

$$P(X > x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} > \frac{x - 50}{8}\right) =$$
$$= P(Z > z) = 1 - \Phi(z) = 1\% = 0,01$$

Mas $1 - \Phi(z) = \Phi(-z)$

Logo $-z = \Phi^{-1}(0,01)$






Procurando na tabela, o valor (z)
mais próximo de $1\% = 0,01$, tem-se:
 $z = -2,33$

Conforme pode ser visto na
próxima lâmina!



| z | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| -3 | 0,0013 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0005 |
| -2,9 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 |
| -2,8 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 |
| -2,7 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0032 |
| -2,6 | 0,0047 | 0,0045 | 0,0044 | 0,0043 |
| -2,5 | 0,0062 | 0,0060 | 0,0059 | 0,0057 |
| -2,4 | 0,0082 | 0,0080 | 0,0078 | 0,0075 |
| -2,3 | 0,0107 | 0,0104 | 0,0102 | 0,0099 |
| -2,2 | 0,0139 | 0,0136 | 0,0132 | 0,0129 |
| -2,1 | 0,0179 | 0,0174 | 0,0170 | 0,0166 |
| -2,0 | 0,0228 | 0,0222 | 0,0217 | 0,0212 |

z = -2,33



Como

– $z = \Phi^{-1}(0,01)$, tem – se :

$$-(-2,33) = \frac{x - 50}{8} \Rightarrow$$

$$x = 2,33 \cdot 8 + 50 = 68,64$$



Propriedade Reprodutiva

Suponha que se tenha “n” variáveis normais independentes X_1, X_2, \dots, X_n , isto é, $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i)$.

Se $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, então;


$$\mu_Y = \mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n \text{ e}$$

$$\sigma_Y^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2$$



Exemplo

Uma montagem consiste de três componentes, conforme figura abaixo.



As dimensões de cada componente

são dadas por:

$$X_1 \sim N(12, 0,02^{1/2})$$

$$X_2 \sim N(24, 0,03^{1/2})$$

$$X_3 \sim N(18, 0,04^{1/2})$$



Os componentes são produzidos por diferentes máquinas e operadores, de modo que se acredita que suas dimensões são independentes.

Determinar $P(53,8 \leq Y \leq 54,2)$.



Solução

A distribuição de Y é dada por:

$$\mu = 12 + 24 + 18 = 54$$

E sua variância é:

$$\sigma^2 = 0,02 + 0,03 + 0,04 = 0,09.$$

Portanto $\sigma = 0,30$. Assim:

$$Y \sim N(54, 0,3)$$



Portanto:

$$\begin{aligned} P(53,8 \leq Y \leq 54,2) &= \\ &= P(-0,67 \leq Z \leq 0,67) = \\ &= \Phi(0,67) - \Phi(-0,67) = \\ &= 49,50 \% \end{aligned}$$



Generalização da Propriedade Reprodutiva

Se $Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n$, e as variáveis X_i são independentes, então:

$$\mu_Y = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \mu_i$$

$$\sigma_Y = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2}$$



Aproximação Binomial - Normal



Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística



É possível se estabelecer aproximações entre as variáveis discretas: Binomial, Hipergeométrica e Poisson conforme visto.

É, também, possível aproximar uma variável discreta (a Binomial) por uma contínua (a Normal).



$$P(X = x) \cong P(x - 0,5 \leq Y \leq x + 0,5)$$


$$P(x_1 < X < x_2) \cong P(x_1 + 0,5 \leq Y \leq x_2 - 0,5)$$

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) \cong P(x_1 - 0,5 \leq Y \leq x_2 + 0,5)$$

Onde Y é uma normal de média $\mu = np$ e desvio variância $\sigma^2 = npq$



Graficamente



Exemplo

Determinar a probabilidade de que em 120 lançamentos de um dado honesto se obtenha face seis:

- (a) Exatamente 20 vezes.
- (b) Mais do que 30 vezes.



Tem-se:

X = número de faces seis em 120
lançamentos.

$$n = 120$$

$$p = 1/6$$

$$X \sim B(120; 1/6)$$



Exemplo

Então:

$$(a) P(X = 20) = \binom{120}{20} \left(\frac{1}{6}\right)^{20} \left(\frac{5}{6}\right)^{100} = 9,73\%$$

$$(b) P(X > 30) = 1 - P(X \leq 30) = \\ = 1 - \sum_{x=0}^{30} \binom{120}{x} \left(\frac{1}{6}\right)^x \left(\frac{5}{6}\right)^{120-x} = 0,71\%$$



Exemplo

Aproximado pela normal, tem-se:

Y = número de faces seis em 120 lançamentos, será aproximadamente uma normal:

$$\mu_Y = 120 \cdot (1/6) = 20 \text{ e}$$

$$\sigma_Y = \sqrt{120 \cdot (1/6) \cdot (5/6)} = 4,0825$$



Exemplo

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad P(X = 20) &= P(19,5 < Y < 20,5) = \\ &= P(-0,12 < Z < 0,12) = \\ &= \Phi(0,12) - \Phi(-0,12) = 9,75\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad P(X > 30) &= 1 - P(X \leq 30) = \\ &= 1 - P(Y \leq 30,5) = 1 - P(Z \leq 2,57) = \\ &= \Phi(-2,57) = 0,51\% \end{aligned}$$



Para se definir as **Distribuições t**, χ^2 e F é necessário definir inicialmente a **Função Gama**.

$$\Gamma(k) = \int_0^{\infty} x^{k-1} e^{-x} dx, \quad \text{para } k > 0$$



A função Gama é recursiva, isto é:

$$\Gamma(k+1) = k.\Gamma(k)$$

É a equação funcional da função Gama.

Se n é um inteiro positivo, então:

$$\Gamma(n) = (n - 1)!$$



E uma vez que :

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1$$

A função gama pode ser considerada uma generalização do Fatorial.



Verificar, ainda, que:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$



A Distribuição t (Student)





Uma variável aleatória X tem uma distribuição “t” ou de **Student** se sua fdp for do tipo:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right) \left(1 + \frac{\mathbf{x}^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}}{\sqrt{\pi\nu} \cdot \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}$$

para $\mathbf{x} \in \mathfrak{R}$



Representação Gráfica



Caracterização

Expectância ou Valor esperado

$$\mu = E(X) = 0$$

Variância

$$\text{Var}(X) = \frac{\nu}{\nu - 2}$$

O valor ν é denominado de “Grau de liberdade”



Tabelas

O que é tabelado é a função inversa (percentis), em relação a área à direita (unilateral) de cada curva (uma para cada linha), ou a soma das caudas (bilateral), isto é, a tabela retorna um valor “t” tal que $P(T \geq t) = \alpha$ (unilateral) ou $P(|T| \geq t) = \alpha$.



As duas opções podem ser colocadas em uma mesma tabela. Pode-se ler uma área (α) de cima para baixo e se ter um valor unilateral ($P(T \geq t) = \alpha$) ou ler a área (α) de baixo para cima e se ter um valor “t” tal que $P(T \geq t) = \alpha/2$.



| | 0,200 | 0,100 | 0,050 | 0,040 | 0,030 | 0,020 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 15,894 | 21,205 | 31,821 |
| 2 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 4,849 | 5,643 | 6,965 |
| 3 | 1,600 | 2,480 | 3,720 | 4,196 | 4,896 | 4,541 |
| 4 | 1,476 | 2,015 | 3,037 | 3,398 | 3,998 | 3,747 |
| 5 | 1,476 | 2,015 | 3,037 | 2,757 | 3,003 | 3,365 |
| 6 | 1,440 | 1,943 | 2,817 | 2,612 | 2,829 | 3,143 |
| 7 | 1,415 | 1,895 | 2,665 | 2,517 | 2,715 | 2,998 |
| 8 | 1,397 | 1,860 | 2,506 | 2,449 | 2,634 | 2,896 |
| 9 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,398 | 2,574 | 2,821 |
| 10 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,359 | 2,527 | 2,764 |

$P(|T_9| \geq 2,262) = 5\%$



| | 0,200 | 0,100 | 0,050 | 0,040 | 0,030 | 0,020 |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 15,894 | 21,205 | 31,821 |
| 2 | 1,886 | 2,920 | 4,202 | 4,849 | 5,643 | 6,965 |
| 3 | | | | | 6,996 | 4,541 |
| 4 | | | | | 7,298 | 3,747 |
| 5 | 1,476 | 2,015 | 2,757 | 3,003 | 3,365 | |
| 6 | 1,440 | 1,943 | 2,612 | 2,829 | 3,143 | |
| 7 | 1,415 | 1,895 | 2,517 | 2,715 | 2,998 | |
| 8 | 1,397 | 1,860 | 2,449 | 2,634 | 2,896 | |
| 9 | 1,383 | 1,833 | 2,398 | 2,574 | 2,821 | |
| 10 | 1,372 | 1,812 | 2,359 | 2,527 | 2,764 | |

$P(T_9 < -2,262) = 2,5\%$
 ou
 $P(T_9 > 2,262) = 2,5\%$



A Distribuição Qui-Quadrado



Uma variável aleatória X tem uma distribuição **Qui-Quadrado** se sua fdp for do tipo:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$



Caracterização

Expectância ou Valor esperado

$$E(X) = \nu$$


Variância

$$\text{Var}(X) = 2\nu$$

O valor ν é denominado de “Grau de liberdade”



Representação Gráfica



Tabelas

O que é tabelado é a função inversa, em relação a área à direita de cada curva (uma para cada linha), isto é, dado um valor de área na cauda direita (α), a tabela retorna um valor “x” tal que $P(\chi^2 \geq x) = \alpha$.



| | 0,995 | 0,990 | 0,975 | 0,950 | 0,900 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,016 |
| 2 | 0,010 | 0,020 | 0,051 | 0,103 | 0,211 |
| 3 | 0,072 | 0,115 | 0,216 | 0,352 | 0,584 |
| 4 | 0,207 | 0,297 | 0,484 | 0,711 | 1,064 |
| 5 | 0,412 | 0,554 | 0,831 | 1,145 | 1,610 |
| 6 | 0,676 | 0,872 | 1,357 | 1,925 | 2,204 |
| 7 | 0,989 | 1,239 | 1,888 | 2,592 | 2,833 |
| 8 | 1,344 | 1,647 | 2,180 | 2,733 | 3,490 |
| 9 | 1,735 | 2,088 | 2,700 | 3,325 | 4,168 |
| 10 | 2,156 | 2,558 | 3,247 | 3,940 | 4,865 |

$P[\chi^2_{(2)} \geq 0,211] = 90\%$



| | 0,100 | 0,050 | 0,025 | 0,010 | 0,005 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 41 | 52,949 | 56,942 | 60,561 | 64,950 | 68,053 |
| 42 | 54,000 | 58,000 | 61,656 | 66,161 | 69,336 |
| 43 | 55,200 | 59,200 | 62,927 | 67,454 | 70,616 |
| 44 | 56,369 | 60,481 | 64,201 | 68,710 | 71,892 |
| 45 | 57,505 | 61,656 | 65,478 | 69,957 | 73,166 |
| 46 | 58,641 | 62,830 | 66,610 | 71,201 | 74,437 |
| 47 | 59,774 | 64,001 | 67,821 | 72,443 | 75,704 |
| 48 | 60,907 | 65,171 | 69,023 | 73,683 | 76,969 |
| 49 | 62,038 | 66,339 | 70,222 | 74,919 | 78,231 |
| 50 | 63,167 | 67,505 | 71,420 | 76,154 | 79,490 |

$P[\chi^2_{(49)} \geq 74,919] = 1\%$



A Distribuição F (de Snedecor)



Uma variável aleatória X tem uma distribuição “F” ou de Snedecor se sua fdp for do tipo:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right) m^{\frac{m}{2}} n^{\frac{n}{2}} x^{\frac{m}{2}-1} (n+mx)^{-\frac{m+n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$



Caracterização

Expectância ou Valor esperado

$$E(X) = \frac{m}{m-2}$$


m é o grau de liberdade do numerador e **n** do denominador

Variância

$$\text{Var}(X) = \frac{2(m+n-2)m^2}{m(n-2)(n-4)}$$



Representação Gráfica



Tabelas

O que é tabelado é a percentil 95% ou 99% - área à direita de cada curva (uma para cada par de valores – numerador, denominador) igual a 5% e 1%, isto é, “x” tal que $P[F(m, n) \geq x] = 5\%$ ou $P[F(m, n) \geq x] = 1\%$.



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 161,45 | 199,50 | 215,71 | 224,58 | 230,16 | 233,99 | 236,77 |
| 2 | 18,51 | 19,16 | 19,60 | 19,94 | 20,21 | 20,43 | 20,61 |
| 3 | 10,59 | 10,70 | 10,78 | 10,84 | 10,89 | 10,93 | 10,96 |
| 4 | 7,71 | 7,74 | 7,76 | 7,78 | 7,80 | 7,81 | 7,82 |
| 5 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 |
| 6 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| 7 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| 8 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
| 9 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| 10 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 11 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| 12 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |

$P[F(5,7) \geq 3,97] = 5\%$



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 4052,18 | 4999,34 | 5403,52 | 5684,26 | 5762,26 | 5858,95 | 5928,33 |
| 2 | 98,50 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 34,12 | 30,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 |
| 4 | 21,20 | 18,00 | 16,69 | 15,70 | 14,98 | 14,21 | 13,48 |
| 5 | 16,26 | 13,27 | 12,06 | 11,39 | 10,77 | 10,67 | 10,46 |
| 6 | 13,75 | 10,92 | 9,78 | 9,15 | 8,55 | 8,47 | 8,26 |
| 7 | 12,25 | 9,55 | 8,45 | 7,85 | 7,46 | 7,19 | 6,99 |
| 8 | 11,26 | 8,65 | 7,59 | 7,01 | 6,63 | 6,37 | 6,18 |
| 9 | 10,56 | 8,02 | 6,99 | 6,42 | 6,06 | 5,80 | 5,61 |
| 10 | 10,04 | 7,56 | 6,55 | 5,99 | 5,64 | 5,39 | 5,20 |
| 11 | 9,65 | 7,21 | 6,22 | 5,67 | 5,32 | 5,07 | 4,89 |
| 12 | 9,33 | 6,93 | 5,95 | 5,41 | 5,06 | 4,82 | 4,64 |

$P[F(5, 7) \geq 7,46] = 1\%$




Weibull



A Distribuição de Weibull (1951) é aplicável a uma série de fenômenos, sendo uma das principais áreas os tempos de falha de componentes elétricos e mecânicos.

**Ernest
Hjalmar
Waloddi
WEIBULL
(1887 - 1979)**



A função densidade de probabilidade de Weibull é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta}{\delta} \left(\frac{x-\gamma}{\delta} \right)^{\beta-1} \exp \left[- \left(\frac{x-\gamma}{\delta} \right)^{\beta} \right] & \text{se } x \geq \gamma \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$




Os parâmetros são γ ($-\infty < \gamma < \infty$) o de **locação**, $\delta > 0$ o de **escala** e $\beta > 0$ o de **forma**.

Quando $\gamma = 0$ e $\beta = 1$, a Weibull se reduz a uma exponencial de parâmetro $\lambda = 1/\delta$



Representação Gráfica





A Função de Distribuição

A função $F(x)$ é dada pela seguinte expressão relativamente simples:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \exp\left[-\left(\frac{x-\gamma}{\delta}\right)^\beta\right] & \text{se } x \geq \gamma \\ 0 & \text{se } x < \gamma \end{cases}$$



Representação Gráfica



Exemplo

A distribuição do tempo de falha para um equipamento eletrônico é uma Weibull com parâmetros $\gamma = 0$, $\beta = 1/2$ e $\delta = 100$. Determine a fração de equipamentos que espera resistam mais de 400 horas



Solução

$$\begin{aligned} P(X > 400) &= 1 - F(400) = \\ &= \exp(-\sqrt{400/100}) = \\ &= e^{-2} = 13,53\% \end{aligned}$$



Caracterização



Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística



Expectância ou Valor Esperado

A expectância ou valor esperado de uma Distribuição de Weibull é dada por:

$$\mu = E(X) = \delta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$



Variância

A Variância da Distribuição de Weibull é dada por:

$$\sigma^2 = V(X) = \delta^2 \left\{ \Gamma\left(1 + \frac{2}{\beta}\right) - \left[\Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right) \right]^2 \right\}$$



Assimetria

$$\gamma_1 = \frac{\Gamma(1 + \frac{3}{\beta}) \delta^3 - 3\mu \sigma^2 - \mu^3}{\sigma^3}$$

Curtose

$$\gamma_2 = \frac{\Gamma(1 + \frac{4}{\beta}) \delta^4 - 4\mu \gamma_1 \sigma^3 - 6\mu^2 \sigma^2 - \mu^4}{\sigma^4}$$



A Desigualdade de Tchebycheff



Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística



A desigualdade de Tchebycheff,
Tchebichev ou Chebyshev (1821 –1894),
é dada por:

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) < 1/k^2$$

$$P(|X - \mu| < k\sigma) \geq 1 - 1/k^2$$



Desigualdade de Camp-Meidell

Se a distribuição for unimodal e simétrica, então:

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) < 4/9k^2$$




Estas desigualdades fornecem as probabilidades de que os valores de uma VAD/VAC estejam em um intervalo simétrico em torno da média de amplitude igual a k desvios padrões.



Assim se $k = 2$, por exemplo, a desigualdade de **Tchebycheff** estabelece que o percentual de valores da variável aleatória, que está compreendida no intervalo $\mu \pm 2\sigma$, é de pelo menos $1 - 1/4 = 75\%$.




Representação Gráfica



Na normal este percentual vale exatamente 95,44%. Mas como a normal é simétrica e unimodal, neste caso, um resultado mais próximo é dado pela desigualdade de **Camp-Meidell**, isto é:

$$1 - 4/(9k^2) = 1 - (1/9) = 88,89\%.$$



Exemplo

O número de aviões que chegam a um aeroporto durante um determinado de tempo tem o seguinte comportamento:

$$f(x) = \frac{100^x e^{-100}}{x!} \quad x = 0, 1, 2, 3 \dots$$



Utilize a desigualdade de
Tchebichev para determinar uma
cota inferior da probabilidade
 $P(85 \leq X \leq 115)$



Solução

Como $k = 1,5$, então a probabilidade solicitada deve ser maior ou igual a:

$$1 - \frac{1}{k^2} = 1 - \frac{1}{1,5^2} =$$

$$1 - 0,4444 = 55,56\%$$



O Teorema Central do Limite



Prof. Lorí Viali, Dr. – UFRGS – Instituto de Matemática - Departamento de Estatística



Seja X_1, X_2, \dots Uma seqüência de variáveis aleatórias iid (independentes e identicamente distribuídas) com $E(X_i^2) < \infty$

Sejam $\mu = E(X_i)$ e $\sigma^2 = \text{Var}(X_i)$.

Então para todos os valores **a** e **b** tais que $a \leq b$, tem-se:



$$P \left[a \leq \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq b \right] \rightarrow \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \Phi(b) - \Phi(a)$$

